

Moyenne des reliquats azotés février 2021 pour le Loiret (19/02/2021)

Ces moyennes sont réalisées sur des parcelles ne recevant pas d'apports organiques.

Les valeurs de reliquats sont exprimés en kg d'azote utilisable par hectare sur une profondeur définie par type de sol.

Région
Beauce et sa
bordure d'Orléanais
(1 416 parcelles)

Culture en place	Codes sols DN5	sols					
		Argilo-calcaire mince 11 - 12	Argilo-calcaire moyen 2- 4 - (9) - 13	Limon argileux profond 1 - 3	sols très argileux profonds (9) - 10	sable argileux ou argile sableuse 5 - 6	sable à sable limoneux 16 - 17 - 18 - 19
	précédents	Reliquats 0-60cm	Reliquats 0-75cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-60cm
COLZA	Tous précédents	22	36	41	34	21	13
CEREALES D'HIVER	Céréales pailles enlevées		40	66	61	29	29
	Céréales pailles enfouies	34	56	59	56	26	21
	Maïs grain (millet, sorgho gr.)	33	53	51	60	20	14
	Betteraves	43	46	48	46	33	
	Tournesol	23	44				25
	Colza		59	63			14
	Pomme de terre		48	66			
	Oignon		32				
	Tous précédents	34	51	61	61	29	25
CULTURE DE PRINTEMPS	Céréales pailles enlevées	32	46			32	20
	Céréales pailles enlevées + CIPAN		47	73		41	21
	Céréales pailles enfouies	40	46	61	69	29	16
	Céréales pailles enfouies + CIPAN	40	49	61	64	27	21
	Betteraves	36	46	46	51		
	Maïs grain (millet, sorgho gr.)	32	46	55	67	32	26
	Tous précédents	41	48	61	63	31	23

Région
Gatinais Ouest
et sa bordure
d'Orléanais
(318 parcelles)

Culture en place	Codes sols DN5	sols					
		Argilo-calcaire mince 11 - 12	Argilo-calcaire moyen 2- 4 - (9) - 13	Limon argileux argile limoneuse 1 - 3	sols très argileux profonds (9) - 10	sable argileux ou argile sableuse 5 - 6	sable à sable limoneux 16 - 17 - 18 - 19
	précédents	Reliquats 0-60cm	Reliquats 0-75cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-60cm
COLZA	Tous précédents	22	36	41	34	21	13
CEREALES D'HIVER	céréales pailles enlevées	28	38	66	41	29	29
	céréales pailles enfouies	45	62	59	70	26	21
	Maïs grain (millet, sorgho gr.)	31	47	51	46	20	14
	Betteraves	48	54	48	64	33	
	Tournesol						25
	Colza						14
	Tous précédents	43	45	64	63	29	25
CULTURE DE PRINTEMPS	céréales pailles enlevées		56	59		32	20
	céréales pailles enlevées + CIPAN		47			41	21
	céréales pailles enfouies	59	56	58	60	29	16
	céréales pailles enfouies + CIPAN	50	57	65	52	27	21
	Maïs grain (millet, sorgho gr.)	28	61			32	26
	Tous précédents	49	62	59	54	31	23



Moyenne des reliquats azotés février 2021 pour le Loiret (19/02/2021)

Ces moyennes sont réalisées *sur des parcelles ne recevant pas d'apports organiques*.

Les valeurs de reliquats sont exprimés en kg d'azote utilisable par hectare sur une profondeur définie par type de sol.

Régions Gatinois de l'Est - Berry - Puisaye - Sologne - Val de Loire- Orléanais (1172 parcelles)

Culture en place	Codes sols DN5 précédents	sols		Argilo-calcaire mince	Argilo-calcaire moyen	sols argileux profonds	Limon argileux hydromorphe	Limon battant Limon sableux	Limon & limon argileux caillouteux (6) - 8 - 15	sable argileux ou argile sableuse (5) - (6)	sable à sable limoneux 16 - 17 - 18 - 19
		11 - 12 Reliq. 0-60cm	2- 4 - (9) - 13 Reliq. 0-75cm	(9) - 10 Reliq. 0-90cm	7 - (5) Reliq. 0-90cm	14 Reliq. 0-75cm	(6) - 8 - 15 Reliq. 0-75cm	(5) - (6) Reliq. 0-90cm	16 - 17 - 18 - 19 Reliq. 0-60cm		
COLZA	Tous précédents	22	36	34	24	20	16	21	13		
CEREALES D'HIVER	céréales pailles enlevées	37	44				42	29	29		
	céréales pailles enfouies	27	27	55	29	23	30	26	21		
	Maïs grain (millet, sorgho gr.)	23	41		56	22	30	20	14		
	Betteraves		33					33			
	Légumineuses (pois, féverole,...)	34									
	Tournesol	48	36			15	17		25		
	Colza								14		
	Tous précédents	28	40	59	36	23	34	29	25		
CULTURE DE PRINTEMPS	céréales pailles enlevées		53				21	32	20		
	céréales pailles enlevées + CIPAN		33					41	21		
	céréales pailles enfouies	42	34		40	29	22	29	16		
	céréales pailles enfouies + CIPAN	29	45		24	22	21	27	21		
	Maïs grain (millet, sorgho gr.)	29	29			28	30				
	Tous précédents	32	46	38	36	29	28	31	23		

